



AVITURISMO PUTUMAYO

Paraiso de las Aves.



Por que Visitar Putumayo?

Putumayo y el Sur de Colombia gozan una gran riqueza de atractivos naturales y culturales, los cuales cuentan con las condiciones adecuadas para poder disfrutar de un emotivo viaje en contacto con la naturaleza disfrutando de flora, fauna, paisajes, rios y cascadas.

¿SABIAS QUE?

El departamento del Putumayo tiene registradas 1013 especies (Ebird, 2020), esto equivale al 52% del total de las aves registradas en todo el país, convirtiendo al departamento Amazónico, en uno de los lugares top para todos los avituristas o amantes de las aves; no solo a nivel nacional, también a nivel internacional. El origen de tanta diversidad de aves se debe a que el Putumayo pertenece a la cuenca del Amazonas; lugar donde existen diferentes ecosistemas que albergan esta gran variedad de avifauna.





Cacicus cela

Es una especie de ave passeriforme de la familia Icteridae propia de Sudamérica Su plumaje es de un color amarillo pálido y negro. Son grandes imitadores del canto de otras aves ya que en su repertorio poseen cerca de 200 cantos.

Loros

Es una especie de ave passeriforme de la familia Icteridae propia de Sudamérica Su plumaje es de un color amarillo pálido y negro. Son grandes imitadores del canto de otras aves ya que en su repertorio poseen cerca de 200 cantos.



Saltator maximus

Bastante común en tierras bajas tropicales húmedas, se alimenta de árboles en flor o en fructificación, el parche color beige de la garganta esta está rodeado por la banda negra del pecho y el bigote negro y su espalda verde-oro.



El Putumayo posee una gran riqueza en especial de aves, mariposas, mamíferos y aguas transparentes en un pequeño departamento de 24.885 km² es uno de los treinta y dos departamentos que conforma la República de Colombia.

A LO LARGO DEL PUTUMAYO PODEMOS ENCONTRAR...



En la llanura Amazónica ecosistemas de varzea y humedales que son alimentados por el gran Rio Putumayo, ecosistemas de morichales y bosques de galería. En el pie de monte Andino-Amazónico encontramos ecosistemas conformados por bosques con características ecológicas y ecosistémicas de gran importancia, presentando altos niveles de diversidad de especies de fauna y flora, por lo que son considerados sitios de interés para la conservación biológica y la investigación. En la zona de Colombia, se originan los ríos Putumayo y Caquetá, afluentes del río Amazonas (WCS, 2020). También encontramos ecosistemas subandinos, ecosistemas altos andinos y de páramo. Estos ecosistemas están en altitudes desde los 250 hasta los 3000 msnm.

La diversidad de ecosistemas que conforman al departamento del Putumayo, lo hacen mega diverso y esto se ve reflejado en la avifauna. Podemos encontrar aves con un margen de distribución reducido, esto hace que sean raras en el país y en el mundo; por ende, de gran interés para los observadores de aves y fotógrafos de naturaleza.

Mesembrinibis cayennensis

Pájaro vadeador totalmente oscuro, con pico curvado y patas cortas que le dan una apariencia algo rechoncha, mayormente verde oscuro con un brillo esmeralda y bronceado iridiscente. Prefiere pantanos más boscosos o bordes de río protegidos.



Todirostrum chrysocrotaphum

Mosquero diminuto y contrastantemente marcado del bosque lluvioso de tierras bajas. Negro y amarillo con un pico en forma de bote, su canto es una serie larga y constantes de chips metálicos altos.



Mesembrinibis cayennensis

Pájaro vadeador totalmente oscuro, con pico curvado y patas cortas que le dan una apariencia algo rechoncha, mayormente verde oscuro con un brillo esmeralda y bronceado iridiscente. Prefiere pantanos más boscosos o bordes de río protegidos.

¿QUÉ ES EL AVITURISMO Y PORQUÉ ES TAN IMPORTANTE?

El aviturismo o turismo ornitológico es una forma de ecoturismo que consiste en observar a las aves de una determinada región. Algo importante a tener en cuenta es que el impacto del aviturismo en la naturaleza es generalmente mínimo. Los turistas de aves suelen ser conscientes de la necesidad de proteger el medio ambiente, lo que a menudo se traduce en un comportamiento responsable en el campo.

El aviturismo se ha convertido en una alternativa atractiva para aquellos turistas que buscan experiencias de viajes diferentes. Además, esta práctica no solo permite a los turistas disfrutar de la belleza de las aves y la naturaleza a su alrededor, sino que también contribuye a la conservación de la biodiversidad de la zona.





Cissopis leverianus

Se distribuye por el centro, sur y este de Colombia. Presenta la cabeza, la garganta y el pecho negros azulados brillantes; el vientre y los flancos blancos. Las alas y la cola, notablemente escalonada, son mayormente negras, las plumas de la larga cola con amplias puntas blancas.

Pteroglossus inscriptus

Tucán pequeño encontrado a lo largo del sur de la Amazonía. Escencialmente oscuro por encima y totalmente amarillo por debajo, así como su azulado parche de piel desnuda sobre el ojo y sus marcas oscuras y garabateadas del pico.



Chlorornis riefferii

Tangara Grande y voluminosa que se encuentra subtropicales superiores y templadas de los Andes, Colombia hasta Bolivia. Llamativa y poco probable de confundirla con otra especie: completamente brillante con patas rojas, cara y cobertoras inferiores de la cola rojizas.

BENEFICIOS DEL AVITURISMO

1. Contribuye a la conservación de la biodiversidad.

2. Genera ingresos económicos para las comunidades locales.

3. Brinda oportunidades de investigación científica.

4. Promueve la educación y conciencia ambiental.

“ El aviturismo tiene la posibilidad de impulsar una actividad productiva capaz de generar un impacto económico positivo sobre las comunidades. ”

TANGARA PARZUDAKII

Tangara pequeña e inconfundible con la cara rojo-anaranjado brillante que se vuelve amarillo en la corona y la nuca. También nota el parche negro de las orejas, la espalda negra, ñas partes inferiores y el parche en el hombro verdoso opalescentes y la rabadilla rojiza. Las aves de la ladera este son rojo brillante en la cara, mientras que las de la ladera oeste son más anaranjadas. Se encuentra en parejas o pequeños grupos dentro de bandadas de especies mixtas, generalmente en el dosel.



PICUMNUS LAFRESNAYI

Pájaro carpintero pequeño de tierras bajas y estribaciones en el bosque lluvioso al este de los Andes. Ambos sexos tienen las partes inferiores amarillo pálido con un extenso barrado negro (sin manchas o rayas verticales), espalda marrón dorado y corona negra con manchas blancas. El macho también tiene manchas rojas o amarillas en la frente.



GALBALCYRHYNGHUS LEUCOTIS

El jacamará orejiblanco o jacamar orejiblanco es una especie de ave piciforme de la familia Galbulidae que vive en Sudamérica

AVITURISMO EN EL PUTUMAYO



PARAMO DE BORDONCILLO, SANTIAGO - PUTUMAYO

Es un páramo ubicado en el departamento de putumayo a una hora en carro desde la ciudad de Pasto, se encuentra a una altura de 3.400 metros sobre nivel del mar haciéndolo un lugar importante para la observación de aves de páramo. La actividad de observación de aves se la realiza caminando durante 1.5 km por el sendero inclinado internándose en el páramo el cual se encuentra en buen estado de conservación, es una ruta también muy importante para la fotografía paisajes dejando a la vista la gran laguna del Encano y el completo paramuno de Quilinsayaco.





Chelidoptera tenebrosa

Negro a excepción de su obispillo, la parte inferior de las alas y de la base de la cola que son blancas, y su vientre que es rojizo. Su cola es corta y su pico está curvado hacia abajo.

VANELLUS CAYANUS

Ave playera contrastantemente coloreada de ríos tropicales de tierras bajas. Su plumaje blanco y negro es distintivo y resalta contra sus alas grises y patas anaranjadas. Típicamente se alimenta solo o en pares a lo largo de las costas y playas de ríos.



RAMPHOCELUS NIGROGULARIS

Tangara pequeña y atractiva; carmesí brillante y negro con una máscara negra y pico plateado. Se encuentra más comúnmente en la vegetación cerca de los lagos en herradura, también a veces se encuentra en bosques cercanos y a lo largo de ríos. Los sexos son similares, aunque las hembras son ligeramente más opacas que los machos. La cantidad de carmesí y la máscara negra distinguen fácilmente a esta especie de otras tangaras dentro de su rango.



AVITURISMO EN EL PUTUMAYO

EL TRAMPOLÍN DE LAS AVES, MOCOA - PUTUMAYO

Es una carretera sin pavimentar de 85 km que conduce desde el municipio San Francisco región andina del Putumayo a 2.000 m.s.n.m, cruzando por cultivos, bosques secundarios y primarios llegando hasta el municipio de Mocoa a una altura de 500 m.s.n.m, siendo una de las mejores rutas de observación de aves y de buenos paisajes en el departamento del Putumayo cuya actividad de observación se la realiza en vehículo realizando paradas estratégicas, se recomienda hacer esta ruta en dos días.

Cotinga maynana

Se distribuye por el centro y el oeste de la cuenca amazónica en el sur de Colombia. El plumaje del macho es azul turquesa, en la garganta presenta un parche color púrpura. En las alas, las primarias son negras, los intercisos blancos y los bordes de las coberteras azules. La cola es azul por encima y negra por debajo.



Trogon viridis

Su Anillo ocular celeste en ambos sexos; el macho tiene la cabeza y pecho azul-violáceos, más intenso en la nuca; frente, face y garganta negros, dorsalmente verde brillante, cobertoras alares negras; ventralmente amarillo-anaranjado con timoneras externas blancas, basalmente negras.



Chondrohierax uncinatus

Es una especie de ave rapaz de la familia Accipitridae, sus colores amarillo y naranja y su longitud promedio es de alrededor de 39 cm. Su peso también puede variar de los 350 a 500 gramos. Además, se caracteriza por tener un pico curvo y algo afilado, así como dobles filas de plumas afiladas en la parte externa de sus alas.



AVITURISMO EN EL PUTUMAYO



ATRACTIVO TURÍSTICO FIN DEL MUNDO, MOCOA-PUTUMAYO.

Es un sitio turístico natural ubicado en Mocoa a 8 km en carro de esta ciudad y realizando una caminata de 3 km por sendero empinado entre bosques secundarios y primarios llegando hasta los pozos naturales de la quebrada Dantayaco con piscinas naturales y su imponente cascada que nos cautiva con su majestuosa vista, durante el sendero también se pueden ver algunas especies de aves de piedemonte andinoamazónico.



Celeus elegans

Un clásico carpintero de género celeus; de tamaño medio en general rufo y con cresta enmarañada. Este carece mayormente o en su totalidad de marcas negras en el cuerpo y en las alas, a diferencia de las mujeres los machos tienen bigotera roja.



Myrmelastes hyperythrus

Hormiguero grande y colicorto del sotobosque de bosques inundables de llanura, ambos sexos son mayormente grises con un parche azul de piel desnuda alrededor del ojo y prominentes puntos blancos en los hombros.



Pteroglossus castanotis

Es un ave de la familia Ramphastidae, Mide 37 a 47 cm de longitud incluidos 10 cm del pico y pesa 220 a 310 g. El plumaje es negro de la corona hasta la nuca y a los lados de la cabeza; la parte baja de la nuca y la parte alta de la garganta son castaños. La parte baja de la garganta es negra y el pecho amarillo. Tiene una banda pectoral roja. Los lados de la cabeza son de color marrón oscuro. Piel azul alrededor del ojo.



PUYUMAYO PARAISO DE LAS AVES

RESERVA NATURAL DONDE SE OCULTA EL SOL, VILLAGARZON-PUTUMAYO

Es un atractivo ubicado a 15 minutos del municipio de Villagarzon y a 40 minutos en carro desde Mocoa la capital del departamento del Putumayo, cuenta con senderos en áreas naturales ideales para la observación de aves, mamíferos y balneario natural, la caminata se realiza por bosques secundarios y primarios en terreno empinado. Este es un atractivo de mucha importancia para el turismo en el departamento de Putumayo ya que el sendero se presta para turismo especializado en observación de aves algunos mamíferos y finalizando con una hermosa cascada y balneario natural.



QUERULA PURPURATA

Pájaro grande, mayormente negro que se encuentra en el dosel de bosques de tierras bajas. El macho tiene una garganta de color vino que puede inflar expresivamente, pero a menudo es difícil de ver con poca luz. El color oscuro, el pico plateado grueso y su proporción corporal ayudan a identificarla incluso en la distancia. También escucha por los silvidos distintivos "pru-up, pru-up". Típicamente se encuentra en pequeños grupos vocales que desfilan a través del dosel, a veces siguiendo bandadas de especies mixtas. Compáralo con umbrellabirds, que son más grandes, con cresta y son mucho menos vocales.



SELENIDERA REINWARDTII

Tucán atractivo con un pico grueso del bosque lluvioso de tierras bajas. Los machos son negros arriba, marrones abajo, con un parche amarillo que se extiende a través del ojo; las hembras son similares pero son rojo - marrón arriba. Típicamente se encuentra en las alturas del bosque lluvioso maduro, pero ocasionalmente se encuentra cerca de los bordes del bosque y en las llanuras del bosque lluvioso.



NYCTIBIUS GRANDIS

Ave nocturna monstruosa, superficialmente similar a un búho pero no relacionado. Pálido y moteado de gris con cabeza grande; es más grande que otros pájaros estaca y carece de bigote oscuro. Se camufla bien y es difícil de detectar; más a menudo visto descansando en una rama horizontal durante el día (menos a menudo en una rama rota como otros pájaros estaca). Se encuentra en áreas boscosas y bordes. Activo durante la noche, cuando se alimenta de grandes insectos. Escucha su llamada aterradora, un grito agudo y descendente.



CONOCE EL PUTUMAYO...



RUTA SACHAMATES, MOCOA - PUTUMAYO

Es una ruta de observación de aves en el municipio de Mocoa, la cual cuenta con bosque primario principalmente, el recorrido a realizar es sobre un gradiente altitudinal que va desde los 950 a 1300 metros sobre nivel del mar en el piedemonte andinoamazonico, la observación de aves se la realiza caminando por camino de herradura en buen estado durante todo el día, ida y regreso sobre el mismo sendero.

NYCTIBIUS GRISEUS

Extraño pájaro nocturno como una mezcla entre un búho y un tapacaminos. Con cabeza grande y enormes ojos amarillos. Mayormente marrón grisáceo con marcas irregulares. Además del tamaño más pequeño, la línea negra del bigote ayuda a distinguirlo de Great Potoo. Pasa el día perchado en el extremo de un tocón, donde se mezcla perfectamente y se vuelve muy difícil de detectar. Por la noche, caza principalmente insectos al vuelo desde unapercha expuesta.



TODIROSTRUM CINEREUM

Mosquerito muy pequeño parecido a una corruca, y de distribución en las tierras tropicales a baja altura. Tiene un pico largo y ancho para un ave tan pequeña. Prefiere áreas abiertas o semi-abiertas con árboles dispersos, arbustos, setos vivos, y matorrales. Suele verse en pares, revoleteando con su cola parada. Nota su máscara negra, ojos blancuzcos, y la punta blanca de su cola.



MELANERPES CRUENTATUS

Pájaro carpintero escandaloso y colorido de los bosques de tierras bajas. Su contrastante coloración negra y amarilla es distintiva. Frecuentemente se percha en tocones altos en el bosque maduro y el bosque secundario. Altamente social, a menudo se ve en grupos, especialmente cerca de colonias de anidación.



PUTUMAYO DEPARTAMENTO DE GRAN BIODIVERSIDAD



RESERVA EL ESCONDITE, VILLAGARZON - PUTUMAYO

Se encuentra ubicada a una hora y veinte minutos en carro del municipio de Mocoa, a 350 metros sobre nivel del mar, presenta terreno plano con vegetación secundaria y pequeños humedales, el recorrido se realiza por carretera en borde bosque y por senderos dentro de la reserva siendo este lugar un punto estratégico para observar especies de aves de la región amazónica y además servicio de hospedaje con capacidad para 4 personas en acomodación sencilla y servicio de alimentación.

LEISTES MILITARÍS

La loica pechirroja (*Leistes militaris*) es una especie de ave paseriforme de la familia Icteridae que habita en algunas regiones de Centro y Sudamérica. Está cercanamente relacionada con la loica cejiblanca (*L. superciliaris*), de forma que antaño se consideraba al tordo pechirrojo una subespecie de ésta. Al igual que otras especies del mismo género, es un ave asociada a campo abierto, incluyendo praderas húmedas, pastizales y cultivos.



CHAMAEPETES GOUDOTII

Ave grande parecida a una gallina, pero pequeña para una pava. Distintiva: mayormente marrón con el vientre rojizo y piel facial azul brillante alrededor del ojo rojo. Se encuentra en zonas subtropicales en ambas laderas de los Andes, desde Colombia hasta Bolivia. Bastante discreta y silenciosa; puede ser difícil de detectar ya que se percha en los niveles medio y superior del bosque. A menudo en parejas o grupos pequeños.



ATHENE CUNICULARIA

Búho pequeño y con patas largas, de hábitats abiertos con maleza. A distancia parece marrón con manchas blancas irregulares. Ojos amarillos. Típicamente encontrado en el suelo o perchedo en postes de cercas o rocas. Activo durante el día y la noche cuando caza principalmente insectos y pequeños mamíferos. Cuando se agita, se levanta erguido y abruptamente se inclina hacia abajo. Anida en una madriguera, a menudo excavada por perros de pradera o tortugas.



PUERTO ASIS, UNA RUTA DE OBSERVACION

RESERVA PLAYA RICA Y CENTRO ECOTURÍSTICO KOFAN, PUERTO ASIS, PUTUMAYO

Es una ruta de observación de aves y Mamíferos ubicada en el municipio de Puerto Asis en el departamento del putumayo, la reserva plata rica está desde Mocoa a dos horas en carro mas 30 minutos en bote por el río Putumayo y desde Puerto Asis a 10 minutos en carro mas 30 minutos en bote, es un sendero en bosques secundarios y primarios donde se pueden ver aves amazónicas y de humedales, además la presencia del Titi rojo (*Plecturocebus discolor*). Kofan está ubicado en la carretera principal a 10 minutos en carro desde Puerto Asis es un sitio turístico con un sendero de un kilometro donde hay presencia de madrigueras del mono nocturno *Aotus vociferans*.

JACANA JACANA



Llamativo pájaro de pantano, de tamaño mediano con dedos excepcionalmente largos. En algunas regiones el adulto es completamente negro; en otras poblaciones es más similar a Northern Jacana con las partes superiores marrón rojizas. Siempre tiene la frente y barbas de la base del pico rojas. Los juveniles son muy parecidos a los de Northern Jacana: marrón bronceado arriba con parte inferior y ceja blancas; nota el pico amarillo y los dedos largos para separarlos de otras aves de pantanos. Todas las edades muestran las alas amarillas en vuelo. Se encuentra en humedales, usualmente con una combinación de gramíneas y lirios.

ELANOIDES FORFICATUS

Un rapaz elegante y de forma única, con largas y estrechas alas y una cola muy bifurcada. Blanco y negro con la parte superior de color gris-azul brillante. Usualmente visto en vuelo elevándose y deslizándose mientras tuerce su cola. Los aleteos son profundos y fluidos. Se encuentra en una diversidad de hábitats arbolados con preferencia por hábitats húmedos cerca de ríos y estanques. Se alimenta principalmente de insectos capturados al vuelo.



EUDOCIMUS RUBER

Inconfundible, hermoso ibis rojo anaranjado con las puntas de las alas negras. Los adultos en plumaje reproductivo tienen picos negros. El pico es rosado en otros períodos. Los inmaduros son oscuros arriba con vientres blancos y picos rosados. Restringido a manglares y estuarios fangosos adyacentes.

